



## ORIENTAÇÕES PRÉ-EXAME DE ECOENDOANAL

### LER ATENTAMENTE AS ORIENTAÇÕES ABAIXO NO MÍNIMO 8 DIAS ANTES DO EXAME

1 - Não suspender o uso de medicamentos para pressão alta, coração, dor de cabeça no dia do exame. Tome com um pouco de água 2 horas antes do exame;

2 - Se o exame for com sedação, não tomar medicamento para diabetes no dia do exame;

3 - De acordo com as recomendações recentes da Sociedade Brasileira de Anestesiologia algumas medicações retardam o esvaziamento gástrico e precisam ser suspensas para exames com sedação.

**Lixisenatida ( Soliqua, Lyumia): 1 dia**

**Liraglutida (Victoza, Saxenda): 2 dias**

**Dulaglutida (Trulicity): 15 dias**

**Tirzepatida (Mounjaro): 15 dias**

**Semaglutida (Ozempic, Rybelsus) : 15 dias**

**Sibutramina e Fenproporex: 15 dias**

4 - Informar quais são os medicamentos contínuos utilizados pelo paciente;

5 - Menores de 18 anos devem estar acompanhados pelo responsável legal;

6 - Gestantes não podem realizar o exame de ecoendoanal;

7 - Mulheres que estiverem amamentando podem fazer o exame. O preparo não influencia a amamentação, somente deverão ficar 2 horas sem amamentar após a sedação;

8 - Se estiver em período menstrual poderá realizar o exame normalmente.

Sugerimos uso de absorvente interno;

9 - Pacientes acima de 60 anos que realizaram avaliação anestésica e cardiológica, trazer no dia do exame.

### MEDICAMENTOS PARA COMPRAR

#### • PHOSFO ENEMA 1 FRASCO

Caso seu exame seja para investigação de endometriose, trazer mais 1 frasco para aplicar na clínica.

### ORIENTAÇÕES SOBRE DIETA E JEJUM

Não é necessário realizar restrição alimentar na véspera do exame. Jejum de 8 horas para exames com sedação. Pode tomar água até 2 horas antes do exame.

### COMO REALIZAR O PREPARO

- Aplicar o conteúdo do primeiro frasco via retal 2 horas antes do exame.
- Trazer o segundo frasco para aplicar na clínica 30 minutos antes do horário marcado (aguardar a enfermagem fazer a triagem e orientar o momento de aplicar).

